

Utrecht, 7 februari 2000

PERSBERICHT

Farmacotherapie in beweging

Meer mensen worden eerder met medicijnen behandeld. Hoewel de behandeling met medicijnen steeds intensiever wordt, is het gemiddelde gebruik per patiënt de laatste tien jaar vrijwel gelijk gebleven. Medicijngebruikers belanden steeds minder in het ziekenhuis. Over de periode 1991-1998 is per jaar de gemiddelde stijging voor de maagaandoeningen 4%, voor suikerziekte 2% en voor astma en COPD 1%. Bovendien blijkt dat het aantal opnames in ziekenhuizen relatief afneemt ten opzichte van het aantal patiënten. Dit zijn enkele belangrijke conclusies uit het PHARMO Report "Farmacotherapie in beweging".

Het onlangs opgerichte PHARMO Instituut, ontstaan vanuit een samenwerking op farmaco-epidemiologisch gebied tussen Prismant, U-Expo en de Universiteit Utrecht, heeft een onderzoek uitgevoerd naar de ontwikkelingen in de farmacotherapie in het laatste decennium. Centraal in deze studie staan de volume- en kostenontwikkeling, alsmede de trends in de aard en omvang van ziekenhuisopnames en gerelateerde verrichtingen en consulten. Hierbij is een drietal ziektes nader onderzocht: ziektes aan slokdarm en maag (zuurgerelateerde aandoeningen, zoals maagzweer), suikerziekte (diabetes) en luchtwegaandoeningen (astma en COPD).

Voor alle drie aandoeningen geldt dat de groei in zowel volume als kosten van medicijnen vooral het gevolg is van een toename van het aantal behandelde patiënten. Een intensievere opsporing en diagnostiek leidt ertoe dat het aantal patiënten dat wordt behandeld met medicijnen veel sneller groeit dan zou worden verwacht op basis van vergrijzing en het feit dat er steeds meer chronisch zieken komen. De wetenschappelijke inzichten van hoe medicijnen het best kunnen worden ingezet, zijn de laatste jaren sterk veranderd.

Patiënten die voor suikerziekte worden behandeld, worden steeds scherper ingesteld met het oog op preventie van complicaties op de lange duur, zoals problemen aan het hart en bloedvaten. Patiënten met astma krijgen meer dan vroeger medicatie ter bestrijding van de onderliggende ontsteking die bij deze ziekte veel voorkomt. Maagmiddelen worden eerder gegeven ter voorkoming van bijwerkingen van antireumatica.

Toch nemen de gemiddelde kosten per patiënt voor medicatiebehandeling over de tijd nauwelijks toe. Voor alle aandoeningen geldt dat de behandeling buiten het ziekenhuis sterk is geïntensiveerd.

Het rapport 'Farmacotherapie in beweging' kunt u opvragen bij het PHARMO Instituut, telefoon 030 – 2345 620.